






QUÉBEC MÉRIDIONAL CLÉ des saules (genre *Salix*) au Québec





Fe. plus large vers le tiers...	FORME D'UNE FEUILLE	STIPULES	FEUILLE DESSUS DESSOUS	PARTICULARITÉS fe = feuille	NOM		
HAUT	OBLANCÉOLÉE 	ABSENTES OU PETITES	Mat Glabre-glaucue	0,5-1 m; fe. 2-4 cm, marge entière; stipule absente; tourbières.	<i>S. pedicellaris</i>		
				2 m; fe. 2-10 cm, étroite, subopposée ou opposée, marge entière, subentière ou dentée; stipule absente; tiges fines, pourpres; introduit.	<i>S. purpurea</i>		
	ou OBOVÉE 	FOLIACÉES	Mat Glabre-glaucue	Mat Glabre-glaucue	8 m; fe. 3-8 cm, marge entière, subentière ou dentée; jeune fe. mince et rougeâtre la plupart du temps.	<i>S. discolor</i>	
					5 m; fe. 3-8 cm, marge crénelée ou dentée; semblable à <i>S. lucida</i> mais sans glande à la base des feuilles.	<i>S. pseudomonticola</i>	
					2-4 m; fe. 3-8 cm, marge crénelée ou dentée; semblable à <i>S. discolor</i> mais tiges fines et l'ovaire est pubescent. (<i>Salix discolor</i> × <i>Salix myricoides</i>)	<i>S. xlaurentiana</i>	
					3 m; fe. 5-10 cm, marge entière ou crénelée; nervures proéminentes.	<i>S. bebbiana</i>	
					8 m; fe. 3-8 cm, marge entière, subentière ou dentée; jeune fe. mince et rougeâtre la plupart du temps.	<i>S. discolor</i>	
					1-3 m; fe. 5-10 cm marge entière ou dentée; nervures proéminentes; pratiquement identique à <i>S. bebbiana</i> mais en milieux secs seulement.	<i>S. humilis</i> var. <i>humilis</i>	
					Mat Vilieux	2 m; fe. 2-6 cm, marge entière ou subentière; chaton femelle pubescent et très blanc.	<i>S. glauca</i> ..var. <i>cordifolia</i>
					Lustré Glabre-glaucue	0,2- 6 m; fe. 5-10 cm; marge crénelée ou dentée; grosses stipules; base souvent cordée.	<i>S. eriocephala</i>



QUÉBEC MÉRIDIONAL CLÉ des saules (genre *Salix*) au Québec

Fe. plus large vers le tiers...	FORME D'UNE FEUILLE	STIPULES	FEUILLE DESSUS DESSOUS	PARTICULARITÉS fe = feuille	NOM
CENTRE	ELLIPTIQUE Longues à extrémités arrondies 	FOLIACÉES	Lustré Glabre-glaucue	8 m; fe. 3-8 cm, marge entière, subentière ou dentée; jeune fe. mince et rougeâtre.	<i>S. discolor</i>
				0,2- 6 m; fe. 5-10 cm; marge crénelée ou dentée; grosses stipules; base souvent cordée.	<i>S. eriocephala</i>
			Glabre / Glabre	Introduit, branches tombantes; 12 m; fe. 9-16 cm; marge dentée; (saule pleureur).	<i>S. xsepulcralis</i>
				Introduit; 10 m; fe. 5-12 cm, marge crénelée ou dentée, acuminées; écorce grise.	<i>S. triandra</i>
			Mat Pubescent	3 m; fe. 5-10 cm, marge entière ou crénelée; nervures proéminentes.	<i>S. bebbiana</i>
				8 m; fe. 3-8 cm, marge entière, subentière ou dentée; jeune fe. mince et rougeâtre.	<i>S. discolor</i>
				1-3 m; fe. 5-10 cm marge entière ou dentée; nervures proéminentes; pratiquement identique à <i>S. bebbiana</i> mais en milieux secs seulement.	<i>S. humilis</i> <i>var. humilis</i>
			Mat Villeux	2 m; fe. 2-6 cm, marge entière ou subentière; chaton femelle pubescent et très blanc.	<i>S. glauca</i> <i>..var. cordifolia</i>
				Lustré Glabre	Introduit; 3-12 m; fe.5- 10 cm, marge crénelée ou dentée.
			1,5 m; fe. 4-8 cm, marge crénelée ou dentée; Baie-James et Lac St-Jean.		<i>S. maccalliana</i>
	1,5-4 m; fe. 2-4,5 cm, marge entière ou dentée-glanduleuse; tiges et bourgeons brun clair.	<i>S. planifolia</i>			
	4 m; fe. 6-10 cm, marge dentée glanduleuse; dents nombreuses et très fines.	<i>S. serissima</i>			
	Gros arbre introduit et fréquent; 20 m; fe. 9-15 cm, marge dentée; branches très cassantes; généralement près des cours d'eau. (<i>Salix alba</i> x <i>Salix euxina</i>)	<i>S. xfragilis</i>			
	Tomenteux / Tomenteux	0,5-1,5 m; fe. 5-10 cm, marge entière ou subentière; glauques sur les deux faces.	<i>S. candida</i>		
	Villeux / Villeux	0,5-3 m; fe. 3-8 cm, marge crénelée ou dentée; à maturité, pubescence le long de la nervure principale; base ronde ou cordée.	<i>S. cordata</i>		
	OBLONGUE Arrondi aux deux extrémités 	FOLIACÉES	Mat / Pubescent	3 m; fe. 5-10 cm, marge entière, crénelée ou dentée; nervures proéminentes.	<i>S. bebbiana</i>
			Glabre / Glabre	Introduit; 10 m; fe. 5-12 cm, longuement acuminée; marge crénelée ou dentée.	<i>S. triandra</i>
			Villeux / Villeux	0,5-3 m; fe. 3-8 cm, marge crénelée ou dentée; pubescence le long de la nervure principale; base ronde ou cordée.	<i>S. cordata</i>
			Lustré Glabre	0,2- 6 m; fe. 5-10 cm; marge crénelée ou dentée; grosses stipules; base souvent cordée.	<i>S. eriocephala</i>
				1,5 m; fe. 4-8 cm, marge crénelée ou dentée; Baie-James et Lac St-Jean.	<i>S. maccalliana</i>
Lustré /Pubescent		4-9 m; fe. 6-16 cm, très étroite; marge dentée ou crénelée; dents très espacées.	<i>S. interior</i>		
ABSENTES OU PETITES		Mat Tomenteux	1-8 m; fe. 5-10 cm, marge entière révolutée, dents à l'apex; étamines collés par deux par la base.	<i>S. elaeagnos</i>	
			3-5 m; fe. 5-10 cm longue et étroite; marge entière souvent révolutée.	<i>S. pellita</i>	
			Introduit; 9 m; fe 10-16 cm longue et très étroite, marge entière révolutée.	<i>S. viminalis</i>	
LINÉAIRE Bord presque parallèle 		FOLIACÉES	Mat / Tomenteux	Introduit; 9 m; fe 10-16 cm longue et très étroite, marge entière révolutée.	<i>S. viminalis</i>
	Lustré / Pubescent		4-9 m; fe. 6-16 cm, très étroite; marge dentée ou crénelée; dents très espacées.	<i>S. interior</i>	
	ABSENTES OU PETITES	Mat Tomenteux	3-5 m; fe. 5-10 cm longue et étroite; marge entière souvent révolutée.	<i>S. pellita</i>	
			1-8 m; fe. 5-10 cm, marge entière révolutée, dents à l'apex; étamines collés par deux par la base.	<i>S. elaeagnos</i>	



QUÉBEC MÉRIDIONAL CLÉ des saules (genre *Salix*) au Québec

Fe. plus large vers le tiers...	FORME D'UNE FEUILLE	STIPULES	FEUILLE DESSUS DESSOUS	PARTICULARITÉS fe = feuille	NOM
BAS	<p>LANCÉOLÉE OU OVÉE (ovale) En forme de lance</p>  	FOLIACÉES moins de 6 m	Mat Glabre-glaucue	3-6 m; fe. 5-15 cm; marge entière ou dentée; tige fine rougeâtre ou jaune; bourgeon deux couleurs à l'automne.	<i>S. petiolaris</i>
				5 m; fe. 3-8 cm; marge crénelée ou dentée; semblable à <i>S. lucida</i> mais sans glande à la base des feuilles.	<i>S. pseudomonticola</i>
				3 m; fe. 5-10 cm; marge dentée sans glande; semblable à <i>S. petiolaris</i> ; bourgeon jaune avec une certaine pubescence.	<i>S. sericea</i>
			Mat Vilieux	2 m; fe. 2-6 cm, marge entière ou subentière; chaton femelle pubescent et très blanc.	<i>S. glauca</i> ..var. <i>cordifolia</i>
				Lustré Glabre	1,5-4 m; fe. 2-4,5 cm; marge entière ou dentée-glanduleuse; tiges brunes; bourgeon brun clair.
			0,4-4 m; fe. 3-10 cm; marge dentée; base cordée; tiges et bourgeons rouge-vin.		<i>S. pyrifolia</i>
			4-6 m; fe. 5-13 cm longuement acuminées; marge dentée; glandes à la base des feuilles.		<i>S. lucida</i>
			5-15 m; fe. 5-13 cm longuement acuminées; marge dentée; glandes à la base des feuilles; maladie de la tache noire sur les feuilles.		<i>S. pentandra</i>
		FOLIACÉES plus de 6 m	Mat-soyeuse Glabre	Gros arbre introduit et fréquent; 20 m; fe. 9-15 cm; marge dentée; branches cassantes; près des cours d'eau. (<i>Salix alba</i> × <i>Salix euxina</i>)	<i>S. ×fragilis</i>
				Introduit; 5-25 m; fe. 5-12 cm; marge dentée; écorce jaune ou orangée.	<i>S. alba</i>
			Tomenteux Tomenteux	Introduit; 0,5-1,5 m; fe. 5-10 cm, marge crénelée ou dentée; glauques sur les deux faces.	<i>S. candida</i>
				Lustré Glabre	Introduit; 3-12 m; fe. 5-10 cm; marge crénelée ou dentée.
			Introduit; 5-25 m; fe. 5-12 cm; marge dentée; écorce jaune ou orangée.		<i>S. alba</i> var. <i>vitellina</i>
			Glabre Glabre	0,3-5 m; fe. 3,5-12 cm; marge crénelée ou dentée; grosses stipules dentées entourant la tige.	<i>S. myricoides</i>
				Introduit; 10 m; fe. 5-12 cm, longuement acuminées; marge crénelée ou dentée; écorce grise.	<i>S. triandra</i>
			ABSENTES OU PETITES	Mat Tomenteux	3-5 m; fe. 5-10 cm longue et étroite; marge entière souvent révoluée.
Lustré / glabre	4-20 m; fe. 4-12 cm; marge dentée; tiges minces flexibles.	<i>S. amygdaloides</i>			




EN DEHORS DU QUÉBEC MÉRIDIONAL CLÉ des saules (genre *Salix*) au Québec

Fe. plus large vers le tiers.....	FORME D'UNE FEUILLE	STIPULES	FEUILLE DESSUS DESSOUS	PARTICULARITÉS fe = feuille	NOM
HAUT	OBLANCÉOLÉE  ou OBOVÉE 	FOLIACÉES MOINS de 1 mètre	Lustré Glabre	Prostré; gris bleu; 3-15 cm; fe. 2-4 cm, entière ou subentière, glauque en dessous; fe. rapprochées sur les tiges	<i>S. arctophila</i>
			Lustré / Pileux	15-20 cm; fe. 1,5- 3 cm; entière ou subentière; Mt Albert	<i>S. chlorolepis</i>
			Mat Villeux	Rampant; 15- 20 cm; fe.1-5 cm; marge entière ou subentière.	<i>S. arctica</i>
			Mat Glabre-glaucue	2 m; fe. 2-6 cm, marge entière ou subentière; chaton femelle pubescent et très blanc.	<i>S. glauca</i> ..var. <i>cordifolia</i>
			Pubescent Pubescent	Prostré; 0,5-2 m; fe. 2-5; marge entière ou subentière; pubescente sur le pourtour.	<i>S. calcicola</i> var. <i>calcicola</i>
		FOLIACÉES PLUS de 1 mètre	Mat Pubescent	0,1-4 m; fe. 5-12 cm, marge entière ou subentière; branches couvertes d'une pubescence blanche dense; longues stipules étroites	<i>S. alaxensis</i>
			Mat Pubescent	3 m; fe. 5-10 cm, marge entière ou subentière; nervures proéminentes	<i>S. bebbiana</i>
			Mat Pubescent	1-3 m; fe. 5-10 cm, marge entière ou subentière; nervures proéminentes; pratiquement identique à <i>S. bebbiana</i> mais en milieux secs seulement.	<i>S. humilis</i> var. <i>humilis</i>
			Mat Glabre-glaucue	8 m; fe. 3-8 cm, marge entière, subentière ou dentée; jeune fe. mince et rougeâtre la plupart du temps.	<i>S. discolor</i>
		ABSENTES OU PETITES	Lustré Glabre	Prostré; 0,2-1 m; fe. 2,5-6.5 cm, marge crénelée ou dentée, dessous glauque; pubescence le long de la nervure principale	<i>S. argyrocarpa</i>
			Lustré Glabre	0,2-1,2 m; fe. 2-6 cm, marge crénelée ou dentée, un peu de pubescences en dessous	<i>S. ballii</i>
			Lustré Glabre	5 cm max rampant formant des tapis; fe. 0,3-2 cm; marge crénelée ou dentée; fe. souvent plus larges que longues	<i>S. herbacea</i>
			Lustré Glabre	Très petit plant, 1-5 cm formant des tapis; fe. 1-2 cm, marge crénelée ou dentée.	<i>S. uva-ursi</i>
			Lustré Villeux	2-15 cm; fe. 2-8 cm, marge crénelée ou dentée, veines proéminentes sur le dessus; pubescentes en dessous	<i>S. vestita</i>
		Mat Glabre-glaucue	0,5-1 m; fe. 2-4 cm, marge entière; stipule absente; tourbières.	<i>S. pedicellaris</i>	

EN DEHORS DU QUÉBEC MÉRIDIONAL CLÉ des saules (genre *Salix*) au Québec

Fe. plus large vers le tiers...	FORME D'UNE FEUILLE	STIPULES	FEUILLE DESSUS DESSOUS	PARTICULARITÉS fe = feuille	NOM
CENTRE	ELLIPTIQUE Longues à extrémités arrondies 	FOLIACÉES MOINS de 1 mètre	Lustré / Glabre	15 -20 cm; fe. 1,5- 3 cm, marge entière ou subentière; Mt Albert.	<i>S. chlorolepis</i>
			Lustré / Pileux	Rampant; 15- 20 cm; fe.1-5 cm, marge entière ou subentière.	<i>S. arctica</i>
		FOLIACÉES PLUS de 1 mètre	Lustré Glabre	Arbre 1-5 m; fe. 3-7 cm acuminée, marge dentée; branches toujours hautes sur l'arbre	<i>S. arbusculoides</i>
				Prostré; 0,2-1 m; fe. 2,5-6.5 cm, marge crénelée ou dentée, dessous glauque; pubescence le long de la nervure principale	<i>S. argyrocampa</i>
				1,5-4 m; fe. 2-4,5 cm; marge entière ou dentée-glanduleuse; tiges et bourgeons brun-clair.	<i>S. planifolia</i>
			Pubescent Pubescent	0,5- 2 m; fe. 2-3 cm; marge entière ou subentière; longs poils sur le pourtour.	<i>S. brachycarpa var. brachycarpa</i>
			Mat Glabre-glaucue	8 m; fe. 3-8 cm, marge entière, subentière ou dentée; jeune fe. mince et rougeâtre la plupart du temps.	<i>S. discolor</i>
			Mat Pubescent	3 m; fe. 5-10 cm, marge crénelée ou dentée; nervures proéminentes.	<i>S. bebbiana</i>
				1-3 m; fe. 5-10 cm, marge entière ou subentière; nervures proéminentes; pratiquement identique à <i>S. bebbiana</i> mais en milieux secs seulement.	<i>S. humilis var. humilis</i>
				8 m; fe. 3-8 cm, marge entière, subentière ou dentée; jeune fe. mince et rougeâtre la plupart du temps.	<i>S. discolor</i>
	Villeux Villeux	0,5-3 m; fe. 3-8 cm, marge crénelée ou dentée; pubescence le long de la nervure principale; base ronde ou cordée.	<i>S. cordata</i>		
	Mat Villeux	2 m; fe. 2-6 cm, marge entière ou subentière; chaton femelle pubescent et très blanc.	<i>S. glauca ..var. cordifolia</i>		
	ABSENTES OU PETITES	Lustré Glabre	0,2-1,2 m; fe. 2-6 cm, marge entière ou subentière; un peu de pubescence en dessous.	<i>S. ballii</i>	
			Très petit plant, 1-5 cm formant des tapis; fe. 1-2 cm, marge crénelée ou dentée.	<i>S. uva-ursi</i>	
			5 cm max rampant formant des tapis; fe. 0,3-2 cm; fe. souvent plus larges que longues, marge crénelée ou dentée.	<i>S. herbacea</i>	
	OBLONGUE Arrondi aux deux extrémités 	FOLIACÉES	Lustré Glabre	Prostré; gris bleu; 3-15 cm; fe. 2-4 cm, marge entière ou subentière, glauque en dessous; fe. rapprochées sur les tiges.	<i>S. arctophila</i>
				Prostré, 3-15 cm; fe. 1-6 cm très réticulée, marge entière ou subentière; le dessous p-ê aussi glauque, pubescent, soyeux avec longs poils blancs.	<i>S. reticulata</i>
			Lustré / Pileux	Rampant; 15- 20 cm; fe.1-5 cm, marge entière ou subentière.	<i>S. arctica</i>
			Mat Pubescent	0,1-4 m; fe. 5-12 cm, marge entière ou subentière; branches couvertes d'une pubescence blanche dense; longues stipules étroites.	<i>S. alaxensis var. alaxensis</i>
		3 m; fe. 5-10 cm, marge crénelée ou dentée; nervures proéminentes.		<i>S. bebbiana</i>	
Villeux Villeux		0,5-3 m; fe. 3-8 cm, marge crénelée ou dentée, pubescence le long de la nervure principale; base ronde ou cordée.	<i>S. cordata</i>		
ABSENTES OU PETITES		Lustré Glabre	Très petit plant, 1-5 cm formant des tapis; fe. 1-2 cm, marge crénelée ou dentée.	<i>S. uva-ursi</i>	
			Prostré; 0,2-1 m; fe. 2,5-6.5 cm, marge crénelée ou dentée, dessous glauque; pubescence le long de la nervure principale.	<i>S. argyrocampa</i>	
	2-15 cm; fe. 2-8 cm, marge crénelée ou dentée, veines proéminentes sur le dessus; fe. pubescentes en dessous	<i>S. vestita</i>			

EN DEHORS DU QUÉBEC MÉRIDIONAL CLÉ des saules (genre *Salix*) au Québec

Fe. plus large vers le tiers...	FORME D'UNE FEUILLE	STIPULES	FEUILLE DESSUS DESSOUS	PARTICULARITÉS fe = feuille	NOM		
BAS	LANCÉOLÉE En forme de lance  	FOLIACÉES	Lustré Glabre	Arbre 1-5 m; fe. 3-7 cm acuminée, marge dentée; branches toujours hautes sur l'arbre	<i>S. arbusculoides</i>		
	1,5-4 m; fe. 2-4,5 cm, marge entière ou dentée-glanduleuse; tiges et bourgeons brun clair.			<i>S. planifolia</i>			
	0,4-4 m; fe. 3-10 cm, marge crénelée ou dentée; base cordée; tiges et bourgeons rouge-vin			<i>S. pyrifolia</i>			
	ou LINÉAIRE Bord presque parallèle 		ABSENTES OU PETITES	Mat Tomenteux	Lustré Mat	4-6 m; fe. 5-13 cm, marge crénelée ou dentée; longuement acuminées; glandes à la base des feuilles	<i>S. lucida</i>
	Mat Glabre / glauque				3-6m; fe. 5-15 cm, marge dentée-glanduleuse; tige fine rougeâtre ou jaune; bourgeon 2 couleurs à l'automne	<i>S. petiolaris</i>	
	Mat Villeux				2 m; fe. 2-6 cm, marge entière ou subentièrre; chaton femelle pubescent et très blanc.	<i>S. glauca</i> ..var. <i>cordifolia</i>	
	Mat Tomenteux	3-5 m; fe. 5-10 cm, marge crénelée ou dentée; marge souvent révolutée			<i>S. pellita</i>		

NOM	DESCRIPTION
S. alaxensis var. alaxensis saule d'Alaska	Régions arctiques; feuilles obovées, oblongues ou elliptiques, dessous blanchâtres pubescents jeunes; marge crénelée ou glanduleuse; longues stipules étroites; jeunes feuilles rougeâtres ou jaune-vert, révolutes.
S. alba saule blanc	Introduit; rameaux cassants, feuilles lancéolées; jeunes feuilles soyeuses sur les 2 faces, devenant glauques en dessous, marge dentée et glanduleuse; bourgeons jaunes ou orangés.
S. alba var. vitellina	Arbuste cultivé échappé de culture; rameaux oranges ou jaunes, flexibles; feuilles lancéolées, lustrées, glabres, dessous blanc pâle, marge dentée-glanduleuse; bourgeons gonflés; autour de Montréal. Similaire à <i>S. alba</i> mais feuilles plus lustrées au-dessus
S. amygdaloides (rare) saule à feuilles de pêcher	Arbre; rameaux minces et pendants, flexibles; feuilles glabres lancéolées ou ovales-lancéolées longuement acuminées, nervure médiane rouge; marge dentée-glanduleuse; pétiole long; petits bourgeons.
S. arbusculoides (rare) saule arbustif	Régions arctiques; feuilles tombantes, elliptiques allongées 3 fois plus longues que larges, lustrées au dessus et pubescentes en dessous avec pubescence courte; marge dentée-glanduleuse; bourgeons petits.
S. arctica saule arctique	Nordique; rameaux rampants formant des tapis, moins de 15 cm de haut; petites feuilles obovées ou elliptiques s'enracinant aux nœuds, pubescentes jeunes et pubescences le long de la nervure principale à maturité; marge entière ou dentée; pubescence sur la marge et à l'apex; endroits secs.
S. arctophila saule arctophile	Nordique; rameaux de 15 cm rampants ou décombrant; feuilles obovées ou étroitement elliptiques, lustrées, pubescentes jeunes, glabres et glauques en à maturité; marge entière ou dentée-glanduleuse, très variable en grosseur; petits bourgeons jaune-brun pâle; rochers de granite
S. argyrocarpa saule à fruits argentés	Nordique et alpine; rameaux rampants ou décombrants; feuilles; oblancéolées à étroitement elliptiques, lustrées, pubescentes, glabres à maturité, dessous glauque. Couvert d'une pubescence blanche; marge entière ou crénelée; pétiole court; petits bourgeons brun clair; pentes de montagnes
S. ballii saule de Ball	Nordique; feuilles elliptiques à obovées; marge entière ou dentée; dessous glauques et glabres, dessus lustré un peu pubescent le long de la nervure principale; feuilles juvéniles quelquefois rougeâtres; Nunavut et Charlton Island à la Baie James.
S. bebbiana saule de Bebb	Général; rameaux flexibles, feuilles elliptiques ou oblongues, souvent de forme losangique allongée; jeunes feuilles rougeâtres, pubescentes, glabres à maturité; dessous blanchâtre; veines proéminentes, marge entière ou légèrement dentée; bourgeons aplatis; pétiole du fruit aussi long que le fruit.
S. brachycarpa var. brachycarpa saule à fruits courts	Nordique; feuilles glauques, elliptiques, oblancéolées ou obovées, villeuses ou longues soies sur les deux faces; marge entière et pubescente; pétioles courts souvent rouges; marais, éboulis, plaines inondables, graviers.
S. calcicola var. calcicola saule calcicole	Nordique; rameaux noueux; feuilles elliptiques ovales ou obovées, marge subentière ou dentée, pubescente; acuminée; jeunes feuilles rougeâtres ou jaunâtres; veines proéminentes; pétiole court; pentes alpines
S. candida saule tomenteux	Général dans les tourbières ou milieux humides; rameaux flexibles; feuilles (5-10 cm) ovées ou elliptiques, pubescentes, gris-bleu, tomenteuses, révolutes; marge subentière ou glanduleuse.
S. chlorolepis (rare) saule à bractées vertes	Actuellement limité au Mont-Albert; rameaux de moins de 20 cm; feuilles oblancéolées, obovées ou elliptiques; marge entière ou dentée, pubescentes sur le pourtour; veines proéminentes.
S. cordata saule à feuilles cordées	Feuilles étroitement oblongues ou étroitement elliptiques, glauques, la nervure principale pubescente le dessous villeux; marge entière ou dentée quelquefois révolutes; jeune feuilles jaunâtres; dunes de sables et plages; plutôt rare au Québec
S. daphnoides saule faux-daphné	Introduit; feuilles elliptiques; acuminées, denticulées-glanduleuses, bientôt glabres, vertes en dessus, glauques en dessous; les stipules sont attachés à la base du pétiole et adnés, ce qui n'est pas usuel.
S. discolor saule discolore	Général; rameaux flexibles; feuilles oblancéolées, obovées ou quelquefois elliptiques, glabres, minces; à nervures peu prononcées; marge, ondulées-crênelées ou dentée, 2-4 ondulations ou dents / cm; les jeunes feuilles souvent rougeâtres; bourgeons souvent noirs et très gros; très variable.
S. elaeagnos saule drapé	Arbre introduit près des habitations; rameaux pendants; feuilles linéaires enroulées sur les bords et blanchâtres, velues-cotonneuses, glauque sur la face inférieure; jeunes rameaux d'abord tomenteux, puis glabres et luisants; les filets des étamines sont soudés à la base. Les fruits sont glabres.

NOM	DESCRIPTION
S. eriocephala saule à tête laineuse	Général; rameaux flexibles; feuilles oblongues, oblancéolées ou lancéolées, marge dentée, souvent teintées de pourpre; stipules entourant presque toute la tige; inflorescences rougeâtres; bourgeons effilés, minces; rouge foncé.
S. glauca var. cordifolia saule glauque	Est du Québec et nordique; feuilles obovées, oblancéolées ou elliptiques, villeuses sur les 2 faces devenant glabres, pubescentes sur le pourtour; quelquefois révolutes; marge entière ou à peine dentée-glanduleuse; pétioles jaunes soyeux; rochers granitiques, alluvion sablonneuse, éboulis.
S. humilis var. humilis saule humble	Général que dans les milieux secs; feuilles oblongues ou elliptiques, pubescentes dessous avec veines proéminentes; jeunes feuilles rougeâtres, pubescentes, glabres à maturité; marge crénelée; flexible; veine principale et pétiole rose. (souvent confondu avec <i>S. bebbiana</i>)
S. herbacea saule herbacé	Espèce arctique alpine; petit plant (5 cm max.) stolonifère, rampant; feuilles obovées ou suborbiculaires, glabres, brillantes, souvent plus larges que longues, pubescentes jeunes et glabres à maturité; marge subentière, crénelée-dentée; bourgeons rouges ronds et pubescents.
S. interior saule de l'intérieur	Général; arbuste formant des bosquets; rameaux flexibles; feuilles linéaires, glabres, subsessiles; jeunes feuilles pubescentes; marge dentée dont les dents sont distantes; pétioles courts. Incl. <i>S. exigua</i> .
S. lucida saule brillant	Général; feuilles lustrées, ovales-lancéolées ou lancéolées, longuement acuminées, plus pâles en dessous; marge dentée-glanduleuse, dents fines; rameaux flexibles; amas de glandes à la base du limbe (une autre var. à feuilles pubescentes et se trouve plus à l'est du Québec).
S. maccalliana (rare) saule de McCall	Nordique; feuilles elliptiques à oblongues, lustrées, acuminées à consistance du cuir, dessous plus pâle, jeunes feuilles rougeâtres; marge dentée-glanduleuse.
S. myricoides saule faux-myrique	Général mais plutôt à l'est du Québec; feuilles ovales ou ovales-lancéolées, les jeunes feuilles pubescentes devenant glabres et luisantes, apex courtement acuminée; dessous glauque; pubescence rouille le long de la nervure principale; nervures proéminentes; stipules persistantes.
S. nigra saule noir	Général; arbre souvent en colonie; milieux humides; rameaux cassants; feuilles et linéaires-lancéolées à lancéolées, marge dentée-glanduleuse; pétiole glanduleux; grosses stipules persistantes; petits bourgeons triangulaires et pointus.
S. pedicellaris saule pédicellé	Tourbières; rameaux flexibles; feuilles oblancéolées ou elliptiques-oblongues; glauques sur les deux faces, un peu révolutes; marge entière ou dentée-glanduleuse, feuilles sessiles à pétiole court rouge-brun, jaune-brun.
S. pellita saule satiné	Général; longues feuilles linéaires ou lancéolées; marge entière ou ondulée-crénelée, révoluée; jeunes feuilles tomenteuses devenant glabres, veine principale proéminente; bourgeons jaunes.
S. pentandra saule laurier	Général; arbre cultivé; feuilles lancéolées, vert foncé, épaisses, lustrées, acuminées, marge dentée-glanduleuse, amas de glandes à la base du limbe; nervure médiane jaune; bourgeons souvent extrémité noir; semblable à <i>S. lucida</i> mais feuilles plus foncées; très vulnérable aux maladies.
S. petiolaris saule à long pétiole	Général ; rameaux flexibles; feuilles lancéolées; marge subentière ou dentée-glanduleuse, feuilles vertes foncées, glabres (quelquefois vert rougeâtre); bourgeons jaunes ou de deux couleurs tard en saison, doubles plus bas sur le rameau; galle ovale rouge-vin non écaillée spécifique
S. planifolia saule à feuilles planes	Plutôt nord-ouest; feuilles elliptiques à lancéolées, vert foncé, lustrées à nervures jaunes ou rouges; à consistance du cuir, surface dorsale glauque; marge entière ou dentée-glanduleuse; bourgeons floraux beaucoup plus gros que les bourgeons foliaires.
S. pseudomonticola (rare) saule pseudomonticole	Plutôt nordique; feuilles ovales à obovées, glabres, acuminées, glauques en dessous; marge dentée, grosses stipules presque rondes (10 mm); sans glandes à la base des feuilles.
S. purpurea saule pourpre	Petit arbuste cultivé; rameaux fins et violacés; feuilles minces, lancéolées, alternes ou subopposées, oblancéolées, révolutes; pétiole court.
S. pyrifolia saule baumier	Général; tourbières; rameaux flexibles, lustrés rouges, pourpres; feuilles ovales-lancéolées à base souvent cordée; marge dentée, dents fines, nervures rouges ou jaunes; dégage une odeur balsamique; bourgeons rouge vin.
S. sericea saule soyeux	Général; près des cours d'eau; tiges pourpres ou jaunes; feuilles à marge dentée, jeunes feuilles laineuses devenant glabres, pubérulentes en dessous; bourgeons jaunes légèrement pubescents.

NOMS	DESCRIPTION
S. reticulata saule réticulé	Nordique; grosses tiges rampantes de 15 cm; feuilles elliptiques-rondes, oblongues, lustrées, rétuses, nettement réticulées, révolutes; jeunes feuilles pubescentes sur les deux faces; veines toutes recourbées vers l'apex; long pétiole marge subentière ou dentée-glanduleuse jeunes rougeâtre.
S. serissima saule très tardif	Général; tourbières; floraison tardive; feuilles elliptiques, glabres, lustrées plus pâles en dessous et non glauque; marge dentée-glanduleuse; dents très fines; glandes à la base de la feuille; bourgeons jaunes apprimés. Semblable à <i>S. lucida</i> mais à floraison plus tardive.
S. triandra saule à trois étamines	Introduit; feuilles elliptiques ou lancéolées, glabres sur les deux faces; marge crénelée ou dentées jeunes feuilles rougissantes; écorces grises foncés s'exfoliant; berges et lieux incultes
S. viminalis saule des vaniers	Général, introduit; rameaux flexibles; feuilles longuement linéaires très étroites, pubérulentes, rapport long. / larg. de 6 à 20 fois; nervure centrale jaune; marge entière, révoluée et ondulée; pétiole court; bourgeons jaunes pubescents
S. xsepulcralis nothovar. chrysocoma saule doré	Une variante de <i>S. xsepulcralis</i> (voir <i>S. xsepulcralis</i>) mais les branches dressées; croissance très rapide
S. uva-ursi saule raisin-d'ours	Nordique; petit plant prostré (15 cm); petites feuilles elliptiques, lustrées persistantes à l'état squelettique, glabres dessus et glauques en dessous; marge entière, subentière ou crénelée-glanduleuse; bourgeons jaunes globuleux.
S. xsepulcralis saule pleureur doré	Général; arbre cultivé; (saule pleureur); rameaux minces et pendants; lancéolées ou étroitement elliptiques, pubescentes jeunes et glabres à maturité; dents fines et glanduleuses; bourgeons de grosseur régulière souvent de 2 couleurs. Anc. <i>S. babylonica</i>
S. vestita saule pubescent	Nordique; rameaux pubescents de moins de 15 cm de haut; feuilles fortement oblongues, ovales ou suborbiculaires révolutes à dessous densément laineux devenant glabres excepté le long des nervures principales; marge entière, crénelée-glanduleuse; pétiole pubescent; gros bourgeons jaunes ou rouges.
S. xlaurentiana (rare) saule du golf St-Laurent	Est du Québec; feuilles obovées entières ou dentées-glanduleuses; jeunes feuilles pubescentes, glabres ensuite avec pubescences le long de la nervure principale, pétiole tomenteux; semblable à <i>S. myricoides</i> ou <i>S. discolor</i>
S. xfragilis saule fragile	Général, grand arbre très fréquent près des cours d'eau; rameaux très cassants; feuilles elliptiques, lancéolées; jeunes feuilles pubescentes, glabres à maturité; marge dentée-glanduleuse, dents irrégulières; bourgeons brun clair aplatis, pubescents. Anc. <i>S. xrubens</i> ou <i>S. alba xfragilis</i>

Note :

Les feuilles et les stipules peuvent être beaucoup plus grosses sur les jeunes plants

Plusieurs hybrides non décrits.

RÉFÉRENCES :

Newsholme. Christopher *2002+ Willows-The genus salix

Blondeau. Marcel / Roy. Claude / Currier. Alain *2010+ Plantes des villages et des parcs du Nunavik.

Symonds. W.D. George*1963+ The shrub identification Book.

Victorin. Marie Frère (1995). Flore Laurentienne, 3e édition

Soper, James H. and Heimbürger, Margaret L. (1990). Shrubs of Ontario.

Lamoureux, Gisèle (2002). Flore printanière.

Fernald, Merritt Lyndon (1991). Gray's Manual of Botany.

Holmgren, Noel H. (1998). The Illustrated Companion to Gleason and Cronquist's Manual

Brouillet, L., F. Coursol, S.J. Meades, M. Favreau, M. Anions, P. Bélisle et P. Desmet. (2010+). VASCAN, la Base de données des plantes vasculaires du Canada. <http://data.canadensys.net/vascan/search/?&lang=fr> (consultée le 2012-11-XX)