

Genre *Ribes*

Famille : Grossulariaceae (1 seul genre)

Réf. 1. Nancy R. Morin; FNA Vol. 8(2009), p. 8-42; **13 taxons au Qc**; 53 espèces en Am. du Nord.

http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=128544

2. Haines, A. Flora Novae Angliae (2011); p. 617-619.

- 1) Pédicelles jointés juste en dessous de l'ovaire et de la bractée; une portion du pédicelle demeure sur le fruit..... **2.**
- 2) Tige brune possédant des épines nodales faibles et des acicules internodales; hypanthium glabre; racèmes pendants; baies noires ou pourpres foncés, aciculés et à senteur de moufette; bois frais et humides; feuilles à sinus très profonds; indigène
[gadelier lacustre](#) **1. *Ribes lacustre***
- 2) Tige sans épines nodales, ni acicules internodales **4.**
- 4) Ovaire sessile-glanduleux **5.**
- 5) Plante décidue; feuilles à 3-7 lobes **7.**
- 7) Hypanthium en forme de tasse ou courtement campanulée, 3-4 mm; sépales réfléchies; bractées plus courtes que les pédicelles; ponctuations sur les baies noires; introduit
[gadelier noir](#) (cassis)..... **2. *Ribes nigrum***
- 7) Hypanthium en forme de soucoupe, 0,5-1,5 mm; sépales divergeantes, caduques; racèmes dressés; baies noires; bois humides; [gadelier de la Baie d'Hudson](#)
..... **3. *Ribes hudsonianum* var. *hudsonianum***
- 4) Ovaire glabre ou stipité-glanduleux (aucune glande sessile)..... **9.**
- 9) Hypanthium en forme de soucoupe ou faiblement en forme de bol (plus large que long)..... **10.**
- 10) Baies glabres **11.**
- 11) Pédicelles non glanduleux; sépales verts à brun; pétales crème à rosée; introduit
[gadelier rouge](#)..... **4. *Ribes rubrum***
- 11) Pédicelles stipité-glanduleux; sépales blancs à pourpre-verdâtre; pétales blancs, rosées ou rouge-pourpre **12.**
- 12) Sépales vert-pourpres; pétales rouge-pourpres; racèmes pendants; bois frais et ravins subalpins
[gadelier amer](#) **5. *Ribes triste***
- 12) Sépales blancs; pétales blancs ou rosé;
[gadelier de la Baie d'Hudson](#)
..... **3. *Ribes hudsonianum* var. *hudsonianum***
- 10) Baies un peu glanduleuses, stipité-glanduleuses ou très glanduleuses **13.**

- 13) Bractées sous-tendant les pédicelles 0,9-3,6 mm (jamais plus de la moitié des pédicelles); sépales 1,5-2,5 mm; Hypanthium habituellement glabre ou quelquefois stipité-glanduleux; pétales cunéaire à flablliforme; racème dressé; senteur de moufette si broyé
 gadelier glanduleux.....6. *Ribes glandulosum*
- 13) Bractées soustendant les pédicelles 2-8 mm (aussi longues que les pédicelles) 9.
- 9) Hypanthium campanulé, urcéolé, en forme de tasse, turbiné ou tubulaire (plus long que large)..... 19.
- 19) Hypanthium jaune ou jaune-verdâtre; sépales dorées; pétales jaunes, orangées ou rouges; longueur des hyanthes 1,5-2 fois celle des sépales; introduit
 gadelier doré.....7. *Ribes aureum var. aureum*
- 19) Hypanthium, sépales et pétales verts, blanc-verdâtre, jaune-crème ou teintée de rose à rose-pourpres; racèmes retombants; points résineux dorés sous les feuilles; bractées plus longues que les pédicelles; baies noires lisses; indigène
 gadelier américain 8. *Ribes americanum*
- 1) Pédicelles non jointés (le fruit entraîne le pédicelle entier); style pileux, villeux au moins dans la moitié du bas 34.
- 34) Ovaires sétacées, pileuses; baies densément densément couvertes de poils raides ou flexibles..... 35.
- 35) Étamines égalant les pétales; fruits munis de piquants; tige et branches grisâtres munies de 2-3 épines aux noeuds
 gadelier des chiens 9. *Ribes cynosbati*
- 35) Longueur des étamines de 2-5 fois la longueur des pétales; style 6 mm, conné jusqu'au bout; introduit
 groseiller à maquereau 10. *Ribes uva-crispa*
- 34) Ovaires glabres; baies glabres
- 37) Filets des étamines égalant les pétales; indigène
*Ribes oxycanthoides*
- 38) Limbe densément pileux sur le côté abaxial, base tronquée ou subcordée; apex des sépales arrondis
 groseiller du Nord 11. *Ribes oxycanthoides var. oxycanthoides*
- 38) Limbe finement pubescent sur le côté abaxial, base profondément cordée; apex des sépales tronqués
 groseiller à poils raides.....12. *Ribes oxycanthoides var. setosum*
- 37) Filets des étamines 2-4 fois plus longues que les pétales; styles 3-7 mm; sépales 2,5-5 mm; filets des anthères 1,8-5 mm; base des feuilles cunéaires à cordées ou tronquées; fruits lisses
 groseiller hérissé 13. *Ribes hirtellum*